

## DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL'INTERVENTO CHIRURGICO

### Dati anagrafici del paziente:

etichetta

Cara/o paziente,  
per poter eseguire l'intervento previsto abbiamo bisogno del Suo consenso, dopo aver preso conoscenza delle seguenti informazioni:

### Diagnosi:

L'ectropion consiste nella mal posizione palpebrale nella quale il bordo libero della palpebra rimane ruotato verso l'esterno. Generalmente riguarda la palpebra inferiore. Questa mal posizione è dovuta generalmente ad un rilascio dei tessuti e comporta un'esposizione della superficie oculare con conseguente irritazione, arrossamento e lacrimazione.

### Intervento previsto:

Cantopessia laterale e reinserzione del muscolo retrattore.

### Lato:

- palpebra inferiore destra
- palpebra inferiore sinistra

### tipo di anestesia:

- anestesia locale e sedazione
- narcosi

### Descrizione dell'intervento:

La chirurgia consiste in una resezione congiuntivale a livello della parte interna della palpebra con reinserzione dei tessuti in profondità in modo da permettere al bordo palpebrale ed al meato lacrimale di ritornare nella posizione anatomica. In caso di lassità dei tessuti, viene generalmente eseguito anche un accorciamento della palpebra a livello dell'angolo esterno, rimettendola in tensione.

### Decorso postoperatorio:

Generalmente dopo l'intervento è presente un ematoma ed un edema a livello della palpebra operata di intensità variabile, per la durata di circa una decina di giorni. I punti di sutura vengono asportati una settimana dopo l'intervento.

### Raccomandazioni preoperatorie:

- Restare digiuni per le 6 ore che precedono l'intervento.
- I medicinali che fluidificano il sangue (anticoagulanti, antiaggreganti) in generale devono essere sospesi o modificati, come concordato con il chirurgo.
- Provvedere di essere accompagnati per l'intervento.

**Complicazioni possibili:**

- Infezione (rara, essendo la palpebra un tessuto ben vascularizzato).
- Sanguinamento (molto raramente necessita la riapertura della ferita ed un drenaggio).
- Persistenza parziale dell'ectropion o recidiva a distanza dall'intervento, che può richiedere una ripresa chirurgica.
- Rilascio di una o più suture che può richiedere una ripresa chirurgica.
- Diminuzione della sensibilità cutanea (generalmente transitoria).
- Cicatrici antiestetiche ipertrofiche (raro).
- Diplopia (visione doppia): complicanza rara generalmente dovuta all'effetto dell'anestesia.

Con la firma del presente documento dichiaro di essere stato informato sulla natura e sul significato del suddetto intervento chirurgico, e di aver potuto porre al medico tutte le domande che ritenevo opportune.

Sono cosciente che, come per qualsiasi intervento chirurgico e malgrado l'esecuzione a regola d'arte da parte del chirurgo, l'intervento può presentare il rischio di complicazioni elencate sopra:

Lugano,

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma paziente

\_\_\_\_\_  
Firma medico